

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

20 Mai 1964.

Supplément n° 1 du Bulletin du mois de Mai 1964.

ARBRES FRUITIERS

/Avertissement/

TAVELURES DES POMMIERS ET DES POIRIERS

Indépendamment des risques de contaminations primaires par les ascospores, l'apparition récente des premières taches de Tavelure dans certains vergers, va accroître les dangers d'extension de cette maladie (possibilités de repiquage à partir des conidies formées sur les taches).

Pour assurer une protection correcte des pommiers et des poiriers, un nouveau traitement fongicide devra être exécuté dès réception du présent avis.

/Information/

OIDIUM DU POMMIER

Dans les vergers insuffisamment protégés et sur certaines variétés sensibles, le développement de l'Oïdium est relativement important. Profiter du traitement anti-tavelure pour assurer la protection contre cette maladie.

HYPONOMEUTES

La présence de nids d'Hyponomeutes peut justifier l'application d'un traitement insecticide avec utilisation d'un des produits suivants : Arseniate de plomb, D.D.T., Trichlorfon, Malathion ou Toxaphène, avec addition d'une petite quantité de mouillant.

.../...

185

GRANDE CULTURE

PEGOMYIE DE LA BETTERAVE

Dans certains secteurs, on note actuellement, des pontes de Pégomyie dont les plus avancées vont éclore incessamment.

Un traitement insecticide pourrait éventuellement être exécuté après observation des taches claires caractéristiques sur le feuillage et reconnaissance des jeunes mines entre les deux épidermes. On utilisera alors, l'un des produits figurant sur la liste en votre possession.

Ne pas intervenir en se basant uniquement sur la présence de pontes ; celles-ci sont difficiles à détruire et d'autre part, peuvent ne pas évoluer normalement.

V I G N E

OIDIUM

Compte tenu des conditions climatiques actuelles, les premiers symptômes de l'Oïdium pourront apparaître prochainement.

En conséquence, sur les cépages sensibles, effectuer un premier traitement en utilisant l'un des produits conseillés dans le Bulletin spécial. Opérer de préférence en poudrage. Il est rappelé que le Soufre a une action secondaire sur un certain nombre d'espèces d'Acarie, notamment ceux responsables de l'Erinose et de l'Acariose.

PYRALE DE LA VIGNE

Les premières chenilles de Pyrale ont fait leur apparition dans certaines situations du vignoble. Bien qu'il ne s'agisse, pour l'instant, que de foyers isolés, il est conseillé de surveiller les parcelles de façon à pouvoir, le cas échéant, exécuter un traitement insecticide en utilisant l'un des produits figurant sur la liste remise à chaque abonné (rubrique Vers de la Grappe).

ARAIGNEES ROUGES

On note actuellement, une extension des populations d'Araignées rouges dans plusieurs régions du vignoble alsacien. Il est rappelé qu'un traitement acaricide spécifique peut être effectué selon les directives données dans notre note du 27 Avril 1964.

Les Contrôleurs :
J. BERNARD et C. GACHON.

l'Inspecteur :
J. HARRANGER .

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/Directeur-Gérant : L. BOUYX.

V I G N E

CONCOURS POUR LA DETECTION DES FOYERS PRIMAIRES DE MILDIOU.

Le dépistage des foyers primaires de Mildiou présente un intérêt considérable. C'est la raison pour laquelle la Station d'Avertissements Agricoles organise cette année encore un concours de détection des foyers primaires de Mildiou. Les premières taches pourront être recherchées dans les situations favorables, généralement bien connues des viticulteurs.

Il sera procédé à la répartition de :

3 pris d'une valeur de 25.- F. chacun

8 prix d'une valeur de 15.- F. chacun.

L'envoi aura le maximum de chances d'arriver en parfait état s'il est fait dans un petit paquet et si les feuilles sont enveloppées dans de la mousse, du coton hydrophile légèrement humide ou de préférence dans un sachet en matière plastique.

Il serait intéressant d'obtenir le maximum de précisions sur l'implantation de ces premiers foyers. A cet effet, nous proposons d'utiliser la fiche de renseignements ci-dessous.

à détacher : -----

FICHE DE RENSEIGNEMENTS.

Nom et Prénom :

Adresse :

Commune et Lieu dit :

Cépages :

Situation de ma feuille malade
sur la souche :

Précisions au sujet de l'importance
de ces premières taches :

Exposition de la vigne : coteau - plaine :

Date de la découverte :

Signature :

186